

“Romper puentes es fácil, reconstruirlos... Complicado”

Antonio Torres
Presidente de Fefac

O. MASPONS
Barcelona

La Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (Fefac) ha renovado su junta directiva, al frente de la cual se ha situado Antonio Torres. El presidente de la patronal analiza para EG los retos que tiene por delante.

Pregunta. Llega a la presidencia de Fefac en un momento complicado. ¿Prioridades a corto plazo?

R. Respuesta. Que la situación que vivimos no ponga en riesgo nuestra viabilidad y transmitir el convencimiento de que tenemos una gran oportunidad ante nosotros, basada en hechos objetivos.

P. ¿Qué hechos?

R. Que existe una opinión positiva del colectivo, que es bien valorado. Que el farmacéutico es un profesional preparado, capacitado

y en constante formación para realizar una mayor contribución a un sistema sanitario sin capacidad para asumir más demanda. Y que por su accesibilidad es el primer punto de contacto del ciudadano con un profesional de la salud.

P. ¿Continuismo o cambio?

R. Misma línea de defensa pero resaltando el valor del colectivo.

P. Eso sí, los impagos...

R. Ponen en juego la sostenibilidad actual y futura de la farmacia. Es difícil plantearse nuevas áreas de desarrollo cuando está en riesgo tu supervivencia.

P. ¿Es optimista?

R. Mi obligación es serlo y creer que se solucionará el problema, si no, estoy diciendo a la Administración que aceptamos que no cumpla. Al igual que es mi obligación no romper ningún puente de diálogo con nadie, hacerlo es relativa-

mente fácil, pero reconstruirlo... Es muy complicado.

P. ¿Renunciarían a los intereses si se hace efectivo el cobro?

R. No renunciaremos a ningún derecho si hay una legislación que nos ampare para reclamarlos.

P. Ahí van de la mano con el Consejo de Colegios de Farmacéuticos catalán. ¿Es prioritario reforzar las relaciones?

R. Las prioridades van en función de la búsqueda del mejor resultado para la farmacia. En todo lo que es intrínseco y voluntad del sector, que nos entendamos es una obligación para ambas instituciones. El pacto es esencial.

P. Y más allá de los impagos...

R. Tenemos ante nosotros un ciudadano más interesado y conocedor de los temas de salud y bienestar personal, siendo nosotros el profesional sanitario más accesible,



Antonio Torres, elegido recientemente presidente de la patronal catalana de farmacias Fefac, dice que los impagos hacen que sea “difícil plantearse nuevas áreas de desarrollo”.

ble, preparado, capaz y eficiente para satisfacer esas necesidades.

P. Ahí nos encontramos la cartera de servicios remunerada.

R. Hay que distinguir entre guía y cartera de servicios. La primera y más importante son las actividades que puede desarrollar una farmacia, mientras que la cartera de servicios son los que la Administración financia. Es importante diferenciar, porque la farmacia puede desarrollar muchas más

actividades retribuidas de las que se financian con fondos públicos

P. Y a nivel interno...

R. Transmitir la importancia de estar agrupado en una entidad cuyo único interés es la defensa del titular de farmacia, los puestos de trabajo e inversiones que genera. En cuanto a organización interna, debemos hacer un replanteamiento evolutivo, en aras a una mayor funcionalidad y eficiencia de todos sus órganos y actividades.

Zovircem Labial 50 mg/g Crema. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada gramo de crema contiene: Aciclovir (DOE) 50 mg. Excipientes: Propilenglicol 400 mg, Alcohol cetosteárilico 67,5 mg. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección abajo. **FORMA FARMACÉUTICA:** Crema. Crema de color blanco. **DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas:** Alivio local de los síntomas ocasionados por el herpes labial, tales como: picor, escozor u hormigueo. **Posología y forma de administración:** Uso cutáneo exclusivamente labial. **Adultos y niños mayores de 12 años:** Se debe aplicar una cantidad suficiente de medicamento, para cubrir con una capa fina la zona afectada del labio cinco veces al día, aproximadamente cada cuatro horas, exceptuando las horas de sueño. Es muy importante iniciar el tratamiento lo antes posible en cuanto aparecen los primeros síntomas de la infección (período prodromico o mácula) en el labio, para conseguir mayor eficacia del producto. Se debe continuar el tratamiento durante al menos 4 días. Si no se ha producido la curación, el tratamiento puede prolongarse hasta un total de 10 días. **Niños menores de 12 años:** La aplicación en niños debe realizarse siempre bajo supervisión médica. Es conveniente lavarse las manos antes y después de la aplicación del medicamento, así como evitar, en lo posible, el roce de las lesiones del labio con las manos o con toallas, con objeto de que la infección no empeore ni se transmita a otras partes del cuerpo o a otras personas, ya que se trata de un proceso contagioso. En caso de que los síntomas empeoren o no se observe mejoría en los 10 días de tratamiento, deberá reevaluarse la situación clínica. **Contraindicaciones.** Zovircem labial está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a aciclovir, valaciclovir, o a cualquier otro componente de este medicamento. **Advertencias y precauciones especiales de empleo:** El aciclovir sólo debe utilizarse en el herpes localizado en los labios. No se recomienda aplicar en membranas mucosas, tales como el interior de la boca, nariz o vagina, ya que podría causar irritación local y tampoco debe ser usado para el tratamiento del herpes genital. Se debe tener especial cuidado para evitar el contacto con los ojos. Los pacientes gravemente inmunodeprimidos (por ejemplo pacientes con SIDA, receptores de trasplante de médula ósea o en tratamiento con radioterapia o quimioterapia) deben acudir a su médico antes de iniciar el tratamiento. Como el herpes labial es una recidiva de una infección dentro de la boca que, generalmente, se contrae en edades tempranas, es necesario realizar un primer diagnóstico médico especialmente en el caso de los niños, en los que los síntomas de esta primera infección pueden pasar desapercibidos o confundirse con trastornos de la dentición u otros procesos bucales. **Advertencias sobre excipientes.** Este medicamento puede producir irritación de la piel porque contiene propilenglicol. Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetosteárilico. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No se han descrito interacciones asociadas a la administración por vía tópica de aciclovir. No se deben aplicar simultáneamente otros preparados en la zona afectada mientras dure el tratamiento con este medicamento. **Embarazo y lactancia. Fertilidad.** No hay información de los efectos del aciclovir por vía tópica, oral o intravenosa sobre la fertilidad de la mujer. En un estudio en 20 pacientes hombres con una cantidad normal de esperma, se ha demostrado que el aciclovir administrado por vía oral en dosis de hasta 1g por día durante 6 meses, no tiene efectos clínicamente significativos sobre la cantidad, morfología y movilidad del esperma humano. **Embarazo.** No se ha establecido la seguridad del uso de aciclovir por vía tópica en mujeres embarazadas. Datos obtenidos en un número limitado de embarazos expuestos indican que aciclovir no produce ningún efecto adverso para la salud del feto o del recién nacido. Hasta la fecha, no se dispone de otros datos epidemiológicos relevantes. Los estudios en animales no indican efectos perjudiciales directos o indirectos durante la gestación, desarrollo embrionario o fetal, parto o desarrollo postnatal. Tras la administración tópica de Zovircem labial la absorción sistémica es mínima. **Lactancia.** No se dispone de datos sobre la excreción de aciclovir en la leche materna tras la aplicación tópica del producto. Tras la administración oral de 200 mg de aciclovir cinco veces al día, se ha detectado en la leche materna la presencia del fármaco a unas concentraciones entre 0,6 y 4,1 veces más que la correspondiente concentración plasmática. Estas concentraciones expondrían potencialmente a los lactantes a unas dosis de aciclovir de hasta 0,3 mg/kg/día. **Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:** No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas, pero dada la naturaleza del producto y bajo índice de absorción se espera que esta influencia sea nula o insignificante. **Reacciones adversas:** Se ha utilizado el siguiente convenio para clasificar las reacciones adversas en términos de frecuencia: Muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100, < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000, < 1/100), raras (≥ 1/10.000, < 1/1.000), muy raras (< 1/10.000). **Trastornos del tejido de la piel y subcutáneos:** Poco frecuentes (≥ 1/1000, < 1/100): Quemazón o picazón pasajeros tras la aplicación de Zovircem. Sequedad o descamación de la piel o de los labios. Sensación de prurito. Raras (≥ 1/10.000, < 1/1.000): Eritema, eccema e inflamación en el lugar de aplicación. Dermatitis de contacto tras la aplicación. Cuando se han realizado pruebas de sensibilización, se ha demostrado que, con más frecuencia, las sustancias reactivas eran componentes de la base de la crema en lugar de aciclovir. **Trastornos del sistema inmunitario:** Muy raras (< 1/10.000): Reacciones de hipersensibilidad inmediata incluyendo angioedema. **En caso de observarse la aparición de reacciones adversas, se deben notificar a los sistemas de farmacovigilancia y, en caso necesario, suspender el tratamiento. Sobredosis:** Aun en caso de que se produzca la ingestión oral o aplicación tópica de todo el contenido de un tubo de 2 g de producto Zovircem labial conteniendo 100 mg de aciclovir, no es de esperar que aparezcan efectos adversos. Se han administrado por vía oral dosis de aciclovir de 800 mg cinco veces al día (4 g al día) durante 7 días, sin que se produjeran reacciones adversas. Se han administrado accidentalmente dosis únicas de aciclovir por vía intravenosa de hasta 80 mg/kg sin que se produjeran efectos adversos. El aciclovir se puede eliminar mediante diálisis. **DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes:** Poloxamer 407 | Alcohol cetosteárilico | Laurilsulfato de sodio | Parafina líquida | Parafina blanca blanda | Propilenglicol | Dimeticona | Arlacel 165 (mezcla 50:50 estearato de macrogol y monoestearato de glicerol) | Agua purificada. **Incompatibilidades:** No procede. **Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones:** La eliminación del medicamento no utilizado, y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales, o se procederá a su devolución a la farmacia. **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, S.A. P.T.M. – C/ Severo Ochoa, nº 2. 28760 – Tres Cantos. (Madrid). **CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN:** Medicamento no sujeto a prescripción médica. **PRESENTACIONES DEL PRODUCTO:** Tubo de 2g, PVP: 3,36€, PVP IVA: 3,49€. Bomba dosificadora PVP: 4,80€, PVP IVA: 5,00€