

Primera Guia d'Actuació Farmacèutica en mal de gola

04/03/2014

Com bé coneixeu, el mal de gola és un dels símptomes més freqüents de consulta a la farmàcia comunitària i als centres d'atenció primària.

El 80% dels cops, la seva etiologia és d'origen víric i per tant el seu tractament no requereix la prescripció d'un antibiòtic.

En la línia de facilitar la resolució de les demandes de salut en proximitat, i per tal d'augmentar l'efectivitat i l'eficiència de les actuacions farmacèutiques sobre aquesta patologia, us presentem la **primera Guia d'Actuació Farmacèutica en mal de gola** editada pel **Consell de Col·legis Farmacèutics** que ha estat possible gràcies a la col·laboració de societats científiques de l'àmbit mèdic -**CAMFIC**-, farmacèutic -**SEFAC Catalunya**-, associació professional -**FEFAC**- i l'empara del **Departament de Salut**.

Aquesta Guia **permetrà descartar l'origen bacterià d'una amigdalitis** i indicar-ne l'opció terapèutica més adient, alhora que racionalitza la demanda injustificada de tractament antibiòtic.

Aquesta actuació es basa en un arbre de decisió que contempla el cribratge de la infecció per estreptococ beta-hemolític en aquelles persones susceptibles de patir un origen bacterià del seu quadre.

La Guia facilita una indicació farmacèutica efectiva i segura per controlar la simptomatologia així com derivar eficaçment als serveis mèdics a aquelles persones que poden requerir tractament antibiòtic.

Hi trobareu doncs els aspectes que permetran enfocar degudament la resolució de la demanda, les consideracions tècniques per la realització idònia del cribratge, i l'opció terapèutica més adient a l'hora de realitzar la indicació farmacèutica.

L'atenció a l'amigdalitis sempre realitzada en una zona d'atenció farmacèutica que garanteixi la privacitat i la confidencialitat, es basa en la realització del test que podrà ser adquirit a través dels distribuïdors habituals.

La Guia inclou el model de full de consentiment informat, la novetat d'un full d'informació al pacient per comunicar el resultat i la indicació farmacèutica, així com el que facilita la derivació als serveis mèdics en cas de possible origen bacterià del procés.

Amb la publicació d'aquest protocol d'actuació farmacèutica es vol augmentar la capacitat de resolució del farmacèutic comunitari davant de símptomes de baixa i molt baixa complexitat, en el marc estratègic del nou model de farmàcia assistencial que es pretén a Catalunya.

L'acció **s'emmarca** en l'escenari dels projectes del **Pla de Salut** amb l'objectiu **d'integrar** la tasca del **farmacèutic** comunitari en el contínuum assistencial **de manera coordinada amb** els professionals dels **equips d'atenció primària**.

Tots els professionals i les societats científiques que l'han fet possible esperen que contribueixi eficaçment i satisfactòriament a la resolució d'aquesta patologia tan incident des dels dispositius assistencials de proximitat per tal d'augmentar la qualitat de la resposta a la ciutadania, així com que contribueixi a posicionar de manera fefaent al farmacèutic comunitari dins els processos assistencials.